

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek SEDATIF PC[®] ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

SEDATIF PC[®] **tabletki**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne:

Aconitum napellus	6CH	0.05 mg
Belladonna	6CH	0.05 mg
Calendula officinalis	6CH	0.05 mg
Chelidonium majus	6CH	0.05 mg
Abrus precatorius	6CH	0.05 mg
Viburnum opulus	6CH	0.05 mg

Substancje pomocnicze: laktoza, kroscarmeloza sodu, stearynian magnezu.

Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca
BOIRON SA
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francja

Spis treści ulotki:

- 1.Co to jest lek SEDATIF PC[®] tabletki i w jakim celu się go stosuje ?
- 2.Informacje ważne przed zażyciem leku SEDATIF PC[®] tabletki.
- 3.Jak zażywać lek SEDATIF PC[®] tabletki ?
- 4.Możliwe działania niepożądane.
- 5.Jak przechowywać lek SEDATIF PC[®] tabletki ?
- 6.Inne informacje.

1.Co to jest lek SEDATIF PC[®] tabletki i w jakim celu się go stosuje?

SEDATIF PC[®] tabletki jest lekiem stosowanym wspomagająco w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami, drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach snu.

2.Informacje ważne przed zażyciem leku SEDATIF PC[®] tabletki.

Kiedy nie zażywać leku SEDATIF PC[®] tabletki ?

Leku SEDATIF PC[®] nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SEDATIF PC[®] tabletki ?

Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem

Zażywanie leku SEDATIF PC[®] tabletki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku SEDATIF PC[®] z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie powoduje senności i zawrotów głowy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SEDATIF PC[®] tabletki

Lek SEDATIF PC[®] zawiera w swoim składzie laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Jeżeli podczas stosowania leku zaburzenia snu utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia przyczyny oraz strategii dalszego leczenia.

3. Jak zażywać lek SEDATIF PC[®] tabletki ?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku SEDATIF PC[®] to:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 tabletka rano, 1 tabletka po południu, przy trudnościach w zasypianiu 2 tabletki przed snem, trzymając tabletkę pod językiem, aż do rozpuszczenia.

Dzieci poniżej 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku SEDATIF PC[®]

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku SEDATIF PC[®]

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku SEDATIF PC[®] tabletki: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, SEDATIF PC[®] tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania, i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.Jak przechowywać lek SEDATIF PC[®] tabletki ?

Brak specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku SEDATIF PC[®] po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 08/2009