

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek STODAL[®] granulki ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

STODAL[®] granulki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

Substancje czynne :

Pulsatilla	3CH	0,0044 ml
Rumex crispus	6CH	0,0044 ml
Bryonia	3CH	0,0044 ml
Ipeca	3CH	0,0044 ml
Spongia tosta	3CH	0,0044 ml
Sticta pulmonaria	3CH	0,0044 ml
Antimonium tartaricum	6CH	0,0044 ml
Myocardium	6CH	0,0044 ml
Coccus cacti	3CH	0,0044 ml

Substancje pomocnicze: laktoza, sacharoza.

Zawartość opakowania: 2 pojemniki wielodawkowe po 4 g.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Spis treści ulotki :

- 1.Co to jest lek STODAL[®] granulki i w jakim celu się go stosuje?
- 2.Informacje ważne przed zażyciem leku STODAL[®] granulki.
- 3.Jak zażywać lek STODAL[®] granulki?
- 4.Możliwe działania niepożądane.
- 5.Jak przechowywać lek STODAL[®] granulki?
- 6.Inne informacje.

1.Co to jest lek STODAL[®] granulki i w jakim celu się go stosuje ?

STODAL[®] granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych..

2.Informacje ważne przed zażyciem leku STODAL[®] granulki.

Kiedy nie zażywać leku STODAL[®] granulki ?

Leku STODAL[®] granulki nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek STODAL[®] granulki ?

Nie dotyczy.

Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia.

Zażywanie leku STODAL[®] granulki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku STODAL[®] granulki z jedzeniem i piciem
Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy

Ważne informacje o niektórych składnikach leku STODAL[®] granulki

Lek STODAL[®] granulki zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek STODAL[®] granulki ?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku STODAL[®] granulki to:

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: ssać powoli po 5 granulek 3-4 razy dziennie. Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku STODAL[®] granulki
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku STODAL[®] granulki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku STODAL[®] granulki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, STODAL[®] granulki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek STODAL[®] granulki ?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku STODAL[®] granulki po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel.: 022/702 66 70

Fax. 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2009