

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek SEDALIA[®] ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

SEDALIA[®] **syrop**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

100 g syropu zawiera:

Substancje czynne leku:

Chamomilla vulgaris	9 CH	1,5 g
Gelsemium	9 CH	1,5 g
Hyoscyamus niger	9 CH	1,5 g
Kalium bromatum	9 CH	1,5 g
Passiflora incarnata	3 DH	1,5 g
Stramonium	9 CH	1,5 g

Inne składniki leku to: sacharoza, etanol, kwas benzoesowy, karmel, woda.

Zawartość w opakowaniu: 200 ml.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek SEDALIA[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku SEDALIA[®] syrop.
3. Jak zażywać lek SEDALIA[®] syrop?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek SEDALIA[®] syrop?
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek SEDALIA[®] syrop i w jakim celu się go stosuje?

SEDALIA[®] syrop jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w stanach niepokoju, trudnościach w zasypianiu, zaburzeniach snu.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku SEDALIA[®] syrop.

Kiedy nie zażywać leku SEDALIA[®] syrop

Leku SEDALIA[®] nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SEDALIA[®] syrop

Lek SEDALIA[®] zawiera w swoim składzie sacharozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku SEDALIA[®] syrop z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku SEDALIA[®] syrop z jedzeniem i pićm

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SEDALIA[®] syrop

Lek zawiera sacharozę i niewielkie ilości etanolu:

- 3.9 g sacharozy w 5 ml syropu, co należy wziąć pod uwagę przy podawaniu leku diabetykom
- 0,4% etanolu (16 mg etanolu w 5 ml syropu).

3. Jak zażywać lek SEDALIA[®] syrop?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku SEDALIA[®] to:

Dzieci od 6 roku życia: 5 ml syropu rano i wieczorem przy pomocy miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Dzieci do 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Leczenie należy kontynuować do momentu ustąpienia objawów, nie dłużej jednak niż kilka dni.

Zażycie większej niż zalecana ilości leku SEDALIA[®]

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku SEDALIA[®]

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku SEDALIA[®] syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, SEDALIA[®] syrop, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek SEDALIA[®] syrop?

Brak specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku SEDALIA[®] po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/ 702 66 70

Fax: 022/ 702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 04/2009