ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Myconafine 1%

(*Terbinafini hydrochloridum*)
10 mg/g, krem

Skład:
1 g kremu zawiera:
substancję czynną: terbinafiny chlorowodorek 10 mg;
substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, sodu wodorotlenek, wodę oczyszczoną.

Opakowania:
Tuby zawierające po 7,5 g lub 15 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny:
Axxon Sp. z o. o.
Ul. Puławska 314
02-819 Warszawa

Wytwórca:
GP GRENZACH PRODUKTIONS GmbH
Emil-Barell-Strasse 7
79839 Grenzach-Wyhlen
Niemcy

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Myconafine 1%, krem i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się Myconafine 1%, krem
3. Jak stosować Myconafine 1%, krem
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Myconafine 1%, krem
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Myconafine 1%, krem

1. CO TO JEST LEK MYCONAFINE 1%, KREM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Myconafine 1% ma postać kremu, zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybicze, działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry.

Wskazania:
Myconafine 1%, krem jest wskazany w miejscowym leczeniu**:**
- grzybicy stóp,
- grzybicy fałdów skórnych,
- grzybicy tułowia,
- drożdżycy skóry,
- łupieżu pstrego.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ MYCONAFINE 1%, KREM

Nie należy stosować leku Myconafine 1% w przypadku:
nadwrażliwości na chlorowodorek terbinafiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Myconafine 1%, krem
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie należy stosować leku na błony śluzowe.
Unikać kontaktu leku z oczami. Jeżeli przypadkowo lek dostanie się do oczu, należy je przemyć bieżącą wodą.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża, karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Myconafine 1%, krem w okresie ciąży i karmienia piersią.
Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym do piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Ze względu na zawartość substancji pomocniczych - alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.
Nie są znane interakcje leku Myconafine 1%, krem z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ MYCONAFINE 1%, KREM

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Przed użyciem leku, należy umyć i osuszyć ręce i chorobowo zmienione miejsca na skórze. Następnie niewielką ilość kremu nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze i lekko wetrzeć krem. Po każdorazowym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.
W przypadku stosowania leku w fałdach skórnych, miejsca te można przykryć świeżą i czystą gazą, zwłaszcza używając kremu na noc.

O ile lekarz nie zaleci inaczej lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Grzybica stóp: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica fałdów skórnych: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica tułowia: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Drożdżyca skóry: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Łupież pstry: zwykle raz na dobę przez 2 tygodnie.

Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres czasu, nawet jeżeli objawy zakażenia ustępują już po kilku dniach od zastosowania kremu. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.
Po zastosowaniu leku Myconafine 1% poprawa powinna nastąpić w ciągu kilku dni.

W razie braku poprawy po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku
W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować lek zgodnie ze schematem dawkowania. Należy regularnie stosować lek, gdyż stosowanie zgodnie z zaleceniami zmniejsza ryzyko powrotu zakażenia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Myconafine 1%, krem może powodować działania niepożądane.

Sporadycznie występuje zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych kremem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia.
Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które wprawdzie pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia tych i innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Axxon Sp. z o. o.
Ul. Puławska 314
02-819 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

styczeń 2011