Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Phlebodia ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

PHLEBODIA
600 mg, tabletki powlekane
(Diosminum)

Skład
1 tabletka zawiera 600 mg diosminy (*Diosminum*).
Substancje pomocnicze: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972), substancja powlekająca Sepifilm 002, celuloza mikrokrystaliczna.
Otoczka:
1. Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.
2. Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).
3. Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901).

Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny
LABORATOIRES INNOTHERA
22 Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
Francja

Wytwórca
INNOTHERA CHOUZY
Rue René Chantereau
l' Isle Vert
41150 Chouzy-sur-Cisse, Francja

Spis treści ulotki

1. *Co to jest lek Phlebodia i w jakim celu się go stosuje*
2. *Zanim zastosuje się lek Phlebodia*
3. *Jak stosować lek Phlebodia*
4. *Możliwe działania niepożądane*
5. *Przechowywanie leku Phlebodia*
6. *Inne konieczne informacje dotyczące leku Phlebodia*

1. CO TO JEST LEK PHLEBODIA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Phlebodia jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania:
Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucia ciężkości nóg, bólów, dolegliwości spowodowanych zespołem niespokojnych nóg zmuszających do zmiany pozycji ciała.
Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK PHLEBODIA

Nie należy stosować leku Phlebodia w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na diosminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Phlebodia,
- jeśli objawy niewydolności krążenia żylnego i łamliwości włośniczek nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem,
- jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu nie przeminą w ciągu kilku dni, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zalecenia dotyczące stosowania
Leczenie będzie skuteczniejsze jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia.
Należy unikać słońca, wysokich temperatur, długiego stania, zmniejszyć masę ciała.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie ma wpływu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Phlebodia
Lek może powodować reakcje alergiczne.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PHLEBODIA

Lek Phlebodia należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Dawkowanie:
Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.
Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.
Sposób stosowania i droga podania:
Droga podania: doustna.
Należy połknąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody (pół szklanki).
Lek należy przyjmować razem z posiłkiem.
Okres stosowania leku, częstość przyjmowania i pora w której lek powinien być przyjmowany:
We wszystkich przypadkach należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Phlebodia jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Phlebodia niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Brak danych na temat przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Phlebodia
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Phlebodia może wystąpić
Brak danych na temat skutków przerwania leczenia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Phlebodia może powodować działania niepożądane.
Bardzo rzadko występują działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit rzadko wymagające odstawienia produktu.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Phlebodia mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU PHLEBODIA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Phlebodia po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Abbott Laboratoires Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
tel. 22 319 12 00

Data opracowania ulotki:
06.07.2011