

Ktoś

Tekst ulotki dla pacjenta

2010 -06- 2 8

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Traumeel S ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Traumeel S

krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

100 g kropli zawiera:

Substancje czynne: Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2, Achillea millefolium D3 ana 5 g; Atropa bella-donna D4 25 g; Aconitum napellus D3 10 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulfuris D8 ana 10 g; Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale D8 ana 8 g; Bellis perennis D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 ana 2 g; Hypericum perforatum D2 1 g.

Zawiera 35% (v/v) etanolu.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Zawartość leku w opakowaniu: 30 lub 100 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Traumeel S się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Traumeel S
3. Jak stosować lek Traumeel S
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Traumeel S
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Traumeel S

1. Co to jest lek Traumeel S i w jakim celu się go stosuje

Traumeel S, krople doustne jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach takich jak skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

2. Zanim zastosuje się lek Traumeel S

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jedną z substancji czynnych lub pomocniczych, na arnikę (*Arnica montana*), rumianek (*Chamomilla recutita*), krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*) lub inne rośliny z rodziny złożonych (*Asteraceae* dawniej *Compositae*). Z zasady jeżówka (*Echinacea*) nie powinna być stosowana przy postępujących chorobach układowych jak: gruźlica, białaczka i choroby podobne obrazem klinicznym do białaczki, zapalne schorzenia tkanki łącznej (kolagenozy), choroby autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, AIDS, zakażenie wirusem HIV lub inne przewlekłe choroby wirusowe.

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

Stosowanie leku Traumeel S u dzieci:

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem u dzieci powyżej 12 lat należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Traumeel S

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie. Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie stosować dłużej niż 7 dni.

W przypadku zażycia większej dawki leku Traumeel S niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Traumeel S:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

W rzadkich przypadkach, u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na rośliny z rodziny złożonych (*Asteraceae* dawniej *Compositae*) np. arnikę (*Arnica montana*), rumianek (*Chamomilla recutita*), krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*), mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub skórne reakcje alergiczne (zaczerwienienie, obrzęk i świąd). W takim przypadku należy zaprzestać podawania leku.

U niektórych pacjentów, podczas stosowania leków zawierających wyciągi z jeżówki (*Echinacea*) zaobserwowano wysypkę i świąd skóry, a w rzadkich przypadkach obrzęk twarzy, duszność, zawroty głowy i spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Po podaniu preparatu może wystąpić nadmierne ślinienie i w takim przypadku należy przerwać stosowanie leku.

W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Traumeel S

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać buteleczkę szczelnie zamkniętą.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
tel. 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

28.06.2010

Kod opakowania: