

## ULOTKA DLA PACJENTA

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Engystol ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

---

### Engystol

### tabletki

---

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

#### **Skład:**

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Substancje pomocnicze: stearynian magnezu.

Zawiera laktozę.

**Zawartość leku w opakowaniu:** 50 lub 250 tabletek.

#### **Podmiot odpowiedzialny:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg Str.- 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Engystol
3. Jak stosować lek Engystol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Engystol
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Engystol

### **1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje**

Engystol tabletki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

### **2. Zanim zastosuje się lek Engystol**

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli objawy będą się utrzymywać lub ulegną nasileniu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

### **Stosowanie leku Engystol u dzieci:**

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat ze względu na możliwość zakrztuszenia. O stosowaniu leku u dzieci w wieku 6-12 lat może zdecydować jedynie lekarz.

### **Ciąża i karmienie piersią:**

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży oraz karmienia piersią.

### **Stosowanie innych leków:**

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

### **3. Jak stosować lek Engystol**

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle po 1 tabletkę 3 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

### **W przypadku zażycia większej dawki leku Engystol niż zalecana:**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **W przypadku pominięcia dawki leku Engystol:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Engystol tabletki może powodować działania niepożądane.

Niekiedy, po zastosowaniu leku Engystol, może wystąpić wysypka. W takich przypadkach należy zaprzestać podawania leku i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pojawienia się działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

## 5. Przechowywanie leku Engystol

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

## 6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa  
tel. 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

11.08.2009

Kod opakowania